

BRODITOP® Pasta Plus

ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO

Per uso professionale

Autorizzazione Biocida (PT 14 – Rodenticida) n° IT/2015/00290/MRP

CARATTERISTICHE

BRODITOP® PASTA PLUS è un rodenticida pronto all'uso a base di Brodifacoum, principio attivo che agisce efficacemente contro topi e ratti con una sola ingestione. La morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione permettendo il controllo dell'infestazione, senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia.

L'esca rodenticida **BRODITOP® PASTA PLUS** è caratterizzata da una miscela di componenti di origine alimentare che risulta essere appetibile per le specie sopra indicate. **BRODITOP® PASTA PLUS** contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini e di animali non bersaglio.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Luogo d'impiego

BRODITOP® PASTA PLUS può essere utilizzato per derattizzazioni all'interno ed intorno ad edifici civili e rurali (industrie, abitazioni, magazzini, cantine, ripostigli) e nelle stive delle navi.

Modalità d'impiego:

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Indossare guanti adatti (EN374) durante l'applicazione del prodotto. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti adatti. L'esca deve essere inserita in un contenitore appropriato a prova di manomissione, protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione da parte di bambini e di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Prima di posizionare i contenitori che includono l'esca, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc.

Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (placebo). Utilizzare una spatola per la pulizia delle esche preparate mediante cartuccia.

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse devono essere adeguatamente smaltite. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. In ogni caso le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche. Terminata la disinfestazione smaltire le esche residue secondo la normativa vigente. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 5 settimane.


Alla fine del trattamento togliere i contenitori e smaltire le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

PESTNET

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto:	
Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium Benzoate	0,001 g
Sostanze appetenti ed adescanti (*) q.b	100 g



DOSI D'IMPIEGO

Infestazioni da ratti (<i>Rattus norvegicus</i>):	- 90 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni. - per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo la distanza a 5 metri in caso di forti infestazioni.
Infestazioni da topi (<i>Mus musculus</i>):	- 50 g di esca in busta dose singolarmente confezionata ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni. - per esca confezionata in vaschetta, contenitore esca pre-dosato o cartuccia, utilizzare fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo la distanza a 2 metri in caso di forti infestazioni.

Presentazione dell'esca:

- Colore: blu

TAGLIE E CONFEZIONE DI VENDITA

Esca da 15 g in cartone con manici.	9 kg
-------------------------------------	------

PESTNET ITALIA srl - 35026 Conselve (PD) Via terza strada, 12
tel. 049 950 05 88 - www.pestnet-europe.it

PN.03 TOPICIDA - REV. 00 / Aprile '16